

Produktdatablad

NoroTec™ Bor Comp



Användningsområde

Bladgödsel mot borbrist för jordbruksgrödor.

Innehåll per liter

150g bor

Användning

Det största borbehovet har raps, sockerbetor, bönor och ärter. Vid borbrist är det vanligt, att tillväxtpunkten dör eller att frösättning uteblir. Detta senare gäller raps. Tillväxtpunktens bortdöende är mycket typisk hos sockerbetor. Symptomen kallas för hjärtröta.

NoroTec™ Bor Comp skall användas på ett tidigt utvecklingsstadium eller när borbrist uppstår.

Dosering och behandlingstidpunkt

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering NoroTec™ Bor Comp liter per ha	Vattenmängd liter per ha
Raps	Alt 1: Normalt en behandling vid begynnande stjälksträckning Alt 2: Vid tydlig brist, första behandlingen vid 4-6 örtblad och andra behandlingen vid begynnande stjälksträckning (vid behov).	2-3* 2-3* 2-3* Undvik behandling efter begynnande blomning	200-300
Raps	Stjälksträckning-före blomning	1 l + 2 l Magnesium + 1 l Mangan	200-300
Sockerbetor Rödbetor Kålrötter	Normalt en beh. vid 4-6 örtblad Vid tydlig svår brist, ytterligare en beh. efter 10-14 dagar.	2-3* 2-3*	200-300
Klöver Lusern	Normalt en beh. 10 –15 cm höga plantor Vid tydlig brist ytterligare en beh. 10-14 dagar senare	2* 2*	200-300
Ärter Bönor	Normalt en beh. 10 –15 cm höga plantor Vid tydlig brist ytterligare en beh. 10-14 dagar senare	2* 2*	200-300
Potatis	10-14 dagar efter full uppkomst	1	200-300

* OBS! Åtgärder:

Vid användning av NoroTec™ Bor Comp i dosen 2-3 l/ha samtidigt med NoroTec™ Mangan rekommenderas en tillsats av en pH-sänkare. Tillsätt 0,3 liter av pH-sänkaren Effekt+ per liter avsedd dos NoroTec™ Bor Comp efter att växtskyddsmedlet blandats i sprutan. Därefter tillsätts NoroTec™ Mangan och sist NoroTec™ Bor Comp i sprutan.

Produktdatablad

NoroTec™ Bor Comp



Blandbarhet

Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Ej blandbar med Sumi-alpha.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ Bor Comp
- Fyll därpå resterande mängd vatten.

Försiktighetsåtgärder

Undvik behandling vid extrema klimatiska förhållande som hög temperatur, frost, regn eller då frost och regn kan förväntas. Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll.

Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn

Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10°C

Bäst effekt erhålls om det inte regnar inom minst 2 timmar efter behandling.

Rengöring

Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandling. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

Varningstext

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma.

Lagring

Lagras frostfritt. *Lagringstemperatur 0°C till +26°C.* Förvars svalt och torrt utom räckhåll för barn och husdjur. Hållbarhet 2 år.